

Course du 28 juillet au 2 août 1902.

Note entomologique

Par A. GAUD, Montreux.

En terminant son rapport pour les années 1900-1901, notre dévoué Président émettait le vœu que les courses de la Murithienne fussent *non seulement agréables, mais de vraies explorations scientifiques*. Ce vœu, très légitime en soi, devient irréalisable dès qu'on adopte un itinéraire aussi étendu que celui de la course de 1902.

L'exploration, même superficielle du val de Bagnes, de la Valpeline, des environs d'Aoste et du Saint-Bernard, au point de vue entomologique, demanderait plusieurs années. En effet, nous n'avons fait que passer et chacune de ces régions, dont les richesses sont considérables, nous donnait envie d'abandonner la course pour avoir le temps de chercher les *petites bêtes*. Mais quand on a dans la bande de bons collègues qui vous attendent, il faut hâter le pas pour les rejoindre, et on se console en se disant : Nous reviendrons.

Malgré tout, cette course restera, sans doute, l'une des plus belles, parce que le paysage était captivant, autant par ses beaux sommets, ses vallées pittoresques, ses glaciers, ses torrents et ses rustiques villages que par sa flore ou sa faune. Nous croyons que, dans ces cas-là, le naturaliste, même passionné, ne peut échapper à ses instincts de touriste, surtout s'il a encore,

comme c'était le cas de tous les participants, bon pied et le cœur enthousiaste.

La faune des Coléoptères du val de Bagnes est assez connue. L'ouvrage de M. le chanoine Favre indique un grand nombre d'espèces appartenant à cette belle vallée, et M. le Dr Bugnion y a également récolté un nombre respectable de coléoptères. Aussi ne nous était-il guère possible de faire des découvertes, surtout avec le temps restreint dont nous disposions. Il faut dire encore que nous n'avons rien pris dans le bas de la vallée, parce que, nous étant attardés à Châble, auprès d'un guide malade, il ne nous resta que le temps d'arriver à Fionnay, à la nuit tombante.

Nous indiquerons nos prises par régions, suivant les étapes.

a) De Fionnay à Chanrion.

Cicindela sylvicola Dej.; — *Chloris* Dej.; — *Feronia multipunctata* Dej.; — *Calathus fulvipes* Gyll; — *Harpalus tardus* Panz; — *Staphylinus stercorarius* Ol; — *Philonthus nitidus* F.; — *Aphodius rufipes* L.; — *luridus* v. *nigritus* Payk; — *fœtens* F.; — *obscurus* F.; — *erraticus* Dft.; — *hæmorrhoidalis* L.; — v. *atramentarius* Er.; — *Magdalis violacea* L., sur mélèze, un superbe exemplaire; — *Acmeops strigillata* F.

b) De Chanrion au Col de Fenêtre.

Nebria castanea Bon; — *laticollis* Dej.; — *Gyllenhalii* Schh.; — *Carabus depressus* ♂ ♀ Bon; — *alpinus* Dej.; — *Amara Quenselii* Schh.; — *rufocincta* Dej.; — *Olophrum alpinum* Heer? — *Bembidium* v. *glaciale* Heer; — *Aphodius erraticus* L.; — *Corymbites rugosus* Germ.; — *Cardiophorus riparius* F.; — *Tomicus 6-dentatus* Bœn.; — *Lina collaris* L.; — *Gonioctena affinis* Schh.; — *nivosa* Suff.; — *Chrysomela marginata* L.; — *viridis* Duft.

c) Du Col de Fenêtre à Aoste.

Les mêmes *Nebria*, *Cicindela*, *Feronia* et *Amara* ; — *Harpalus æneus* F. v. *brunn.* ; — *Calathus* v. *alpinus* Dej. ; — *Staphylinus similis* F. ; — *Helophorus glacialis* Heer ; — *Aphodius depressus* Kugel ; — *Byrrhus fasciatus* F. v. *Dianae* Lac. ; — *Tetropium luridum* L. ; — *Lina collaris* L. ; — *Cassida viridis* L.

d) Environs d'Aoste.

Harpalus æneus F. ; — *Pseudophonus griseus* Panz. ; — *Oxyomus alpinus* Drap. ; *Dermestes tessellatus* F. ; — *Ianiarius* Ill. ; — *Lagria atripes* Mul. ; — *Oryctes grypus* ♂ ♀ Ill. ; *Aromia moschata* ♂ ♀ L. ; — *Otiorhynchus helveticus* Boh. ; — *scabrosus* Marsh. ; — *Dasytes pallipes* Panz. ; — *obscurus* Gyll. ; — *Notoxus cornutus* F. ; — *Tychius tomentosus* Herbst. ; — *Cryptocephalus geminus* Gyll. ; — *bilineatus* L. ; — *Lina Tremulæ* ♂ ♀ F. ; — *Chrysomela marginata* L. ; — *limbata* F. ; *Adonia mutabilis* Scrib. ; — *Scymnus bipunctatus* Kugel., etc.

e) D'Aoste au Saint-Bernard.

Le trajet s'étant effectué en voiture, la récolte a été maigre. En coupant quelques contours de route, nous avons capturé :

Cetonia morio F. ; — *Cionus Verbasci* F. ; — *Larinus sturnus* Schall. et *Henicopus pilosus* L., 3 ex. sur graminées.

De Saint-Rémy, sac au dos et bâton en main, nous aurions, sans doute, fait d'excellentes trouvailles ; mais le désir d'arriver à l'Hospice avant la nuit, nous a fait manquer la récolte. Signalons pourtant, avec le *Nebria Gyllenhalii*, la v. *arctica*, cueillie à 200 m. au-dessus de Saint-Rémy.

Nous comptons nous rattraper le lendemain au St-

Bernard; mais la pluie et le vent nous ont chassés de ces lieux si propices et notre entêtement seul nous a permis de saisir, en descendant : *Carabus alpinus* Dej.; — *bernhardinus* Hertz.; — *Cymindis punctata* Dej.; — *Geotrupes mutator* Marsh.; — *Staphylinus stercorarius* Ol.

A partir de Bourg-St-Pierre, adieu *Carabus*, *Nebria*, *Bembidium*..... il ne nous restait que le temps de gagner Martigny pour y prendre l'avant-dernier train.

C'est égal, nous nous consolons de n'avoir pu faire mieux en songeant que..... le val de Binn nous réserve en compensation de joyeuses surprises.
